


# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## ИНСТРУКЦИЯ

(информация для пациентов)

### по медицинскому применению лекарственного средства Д-Форжект

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом приема лекарства.

- Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к Вашему лечащему врачу.

**Торговое название:** Д-Форжект

**Международное непатентованное название:** macrogol, combination

**Лекарственная форма:** порошок для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах в упаковке № 4.

**Состав:** один пакет содержит:

*активные вещества:* макрогол 4000 – 64,0 г, натрия сульфат безводный - 5,7 г, натрия гидрокарбонат - 1,68 г, натрия хлорид - 1,46 г, калия хлорид - 0,75 г;

*вспомогательные вещества:* сахарин натрий.

**Описание:** Порошок белого или почти белого цвета, легко растворимый в воде.

**Фармакотерапевтическая группа:** Осмотически действующие слабительные средства. Макрогол в комбинации.

**Код АТХ:** А06АD65

### Фармакологические свойства

Лекарственное средство представляет собой смесь макрогола 4000 (высокомолекулярного полимера) и электролитов. Фармакодинамический эффект заключается в индуцировании диареи.

Высокомолекулярные (4000) макроголы представляют собой длинные линейные полимеры, на которых удерживаются молекулы воды при помощи водородных связей. При пероральном приеме они увеличивают объем содержащейся в кишечнике жидкости. Слабительные свойства раствора объясняются объемом неабсорбируемой жидкости, находящейся в кишечнике.

Содержание электролитов в лекарственном средстве сбалансировано для предотвращения всасывания и секреции воды и электролитов в пищеварительном тракте. Благодаря этому очищение кишечника происходит без нарушения водно-электролитного баланса в организме.

### Показание к применению

Кишечный лаваж (очищение кишечника), обеспечивающий предварительную подготовку пациентов к:

- эндоскопическому или рентгенологическому исследованию кишечника;
- оперативным вмешательствам на кишечнике.

### Способ применения и дозы

Препарат Д-Форжект можно применять только у взрослых пациентов. Препарат предназначен для приема внутрь.

Раствор готовят непосредственно перед применением. Содержимое одного пакетика следует растворить в 1 л воды, постепенно всыпая порошок и равномерно его размешивая. Необходимую дозу препарата принимают частями по 1 стакану в течение 15 минут отдельными глотками, по 1 литру раствора за 1 час. Дозу препарата устанавливают из расчета 1 литр раствора на 15-20 кг массы тела, что примерно соответствует 3-4 литрам раствора.

Применение препарата может осуществляться по двум схемам: в один или два приема. Одноэтапная подготовка: раствор принимают однократно (4 л вечером, накануне исследования или операции).

Двухэтапная подготовка: 2-3 литра раствора принимают накануне вечером, а оставшуюся часть дозы – утром; прием препарата следует закончить за 3 - 4 часа до проведения процедуры.

Режим приема препарата может рекомендовать лечащий врач в соответствии с клиническим состоянием пациента и потенциальным риском развития осложнений.

Пациентам не следует употреблять твердую пищу за 2-3 ч перед началом приема препарата и до завершения исследования.

*Пациенты с почечной недостаточностью*

Данные по применению препарата у данной группы пациентов ограничены (см. раздел «Меры предосторожности»).

*Дети*

Безопасность и эффективность использования препарата у детей до 18 лет не изучены.

<p style="text-align: center;"><b>СОГЛАСОВАНО</b> МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь</p>
---

### **Побочное действие**

Ожидаемым эффектом применения Д-Форжект является диарея. В начале применения препарата выявлялись случаи тошноты и рвоты, которые, как правило, прекращались при продолжении приема.

Частота побочных эффектов: очень часто ( $>1/10$ ); часто ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ); нечасто ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ); редко ( $\geq 1/10000$ ,  $< 1/1000$ ), очень редко ( $< 1/10000$ ), неизвестно – в случаях, когда частота не может быть определена по имеющимся данным.

*Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:* очень часто - тошнота, боли в области живота, вздутие живота; часто - рвота.

*Аллергические реакции:* неизвестно – гиперчувствительность (анафилактический шок, ангионевротический отек, крапивница, сыпь, зуд).

***Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.***

### **Противопоказания**

- гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.
- тяжелые нарушения общего состояния пациента, такие как обезвоживание или выраженная сердечная недостаточность.
- прогрессирующая карцинома или любое другое заболевание кишечника, сопровождающееся значительным повреждением слизистой оболочки.
- пациентам со склонностью к возникновению или имеющейся кишечной или желудочно-кишечной непроходимостью.
- перфорация или риск развития перфорации желудочно-кишечного тракта.
- нарушения опорожнения желудка (например, парез желудка).
- токсический колит или токсический мегаколон.
- дети до 18 лет.

## **Передозировка**

Случаи передозировки лекарственного препарата не были зафиксированы. Тем не менее, в случаях развития у пациентов тяжелой диареи, обусловленной передозировкой препарата, необходимо контролировать состояние водно-электролитного баланса и уровня гидратации.

## **Риск развития симптома отмены**

Не установлен.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Диарея, вызванная применением препарата Д-Форжект, может привести к нарушению абсорбции других одновременно принимаемых препаратов. Поэтому рекомендуется принимать Д-Форжект спустя по меньшей мере 2 часа после приема других препаратов. Следует избегать приема лекарств до и после использования слабительного средства, пока обследование не будет полностью завершено. ***Ваш лечащий врач должен быть информирован обо всех лекарствах, которые Вы принимаете.***

## **Меры предосторожности**

***Лицам пожилого возраста с различными сопутствующими заболеваниями рекомендуется применять препарат под наблюдением медицинского персонала.***

Д-Форжект содержит полиэтиленгликоль. Очень редко может наблюдаться аллергическая реакция (сыпь, крапивница, отек), вызванная полиэтиленгликолем. Имеется информация относительно крайне редких случаев анафилактического шока. Данный препарат не рекомендуется принимать пациентам с повышенной чувствительностью к полиэтиленгликолю.

Электролитных нарушений при приеме препарата не ожидается благодаря его изотоническому составу, однако такой риск существует. Препарат следует с осторожностью применять пациентам, имеющим склонность к развитию водно-электролитных нарушений (например, у пациентов с нарушением функции почек, с сердечной недостаточностью или при сопутствующем приеме диуретиков).

Препарат должен применяться с осторожностью и под медицинским наблюдением у пациентов со склонностью к аспирации (у больных, прикованных к постели, с неврологическими или двигательными нарушениями) из-за риска развития аспирационной пневмонии. В таких случаях прием препарата осуществляется в сидячем положении больного или с помощью назального зонда. У больных с сердечной и почечной недостаточностью есть риск развития острого отека легких вследствие перегрузки натрием.

***При наличии у Вас одного из перечисленных выше заболеваний или состояний перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.***

## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

### ***Беременность***

Данные о применении Д-Форжект у беременных очень ограничены. Исследования на животных недостаточны для оценки репродуктивной токсичности лекарственного средства. Д-Форжект может быть использован у беременных только в случаях, когда польза превышает риск применения препарата.

### ***Период грудного вскармливания***

Имеется ограниченное количество данных о применении Д-Форжект в период кормления грудью. Не известно, проникает ли макрогол 4000 в грудное молоко. Риск применения препарата у новорожденных/младенцев не может быть исключен. Д-Форжект может приниматься в период кормления грудью только в случаях, когда польза превышает любой риск применения препарата.

### **Фертильность**

Данные о влиянии применения Д-Форжекта на фертильную функцию отсутствуют


### **Влияние препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с движущимися механизмами**

Исследования по изучению влияния препарата на вождение автомобиля и управление механизмами не проводились.

### **Форма выпуска**

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

По 73,69 г препарата помещают в пакет из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги. 4 пакета вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.



### **Условия хранения**

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Предприятие-производитель**

Государственное предприятие «АКАДЕМФАРМ»

220141, г. Минск, ул. академика В.Ф. Купревича,

д. 5, корп.3, Республика Беларусь,

тел./факс 8(017) 268-63-64

Для сообщения о нежелательных реакциях на сайте производителя

<http://academpharm.by> представлена электронная форма обращения