ЛП-№015066-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 05.05.2026 № 495
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002

Листок-вкладыш – информация для пациента

Форжект КИДС, 4 г, порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей

Действующее вещество: макрогол

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Форжект КИДС, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Форжект КИДС.
3. Прием препарата Форжект КИДС.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Форжект КИДС.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Форжект КИДС, и для чего его применяют

Препарат Форжект КИДС содержит действующее вещество макрогол 4000, которое относится к фармакотерапевтической группе под названием «слабительные средства; осмотические слабительные средства».

Показания к применению

Препарат показан к применению для симптоматического лечения запоров у детей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет.

Способ действия препарата Форжект КИДС

Макрогол 4000 является полимерным соединением с большой молекулярной массой, что позволяет ему эффективно связывать и удерживать воду в просвете желудочно-кишечного тракта. Благодаря этому после перорального приема препарата увеличивается объем кишечного содержимого и проявляется слабительный эффект.

Объем неабсорбированной жидкости, находящейся в просвете кишечника, поддерживает слабительное действие раствора.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Форжект КИДС

Противопоказания

Не принимайте препарат Форжект КИДС

- если у Вашего ребенка аллергия на макрогол (полиэтиленгликоль) или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

ЛП-№015066-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 05.05.2026 № 495
Наследственность 0002

- если у Вашего ребенка серьезные воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона) или аномальное расширение кишечника (токсический мегаколон);
- если у Вашего ребенка перфорация или риск перфорации желудочно-кишечного тракта;
- если у Вашего ребенка есть подозрение или известно о полной или частичной кишечной непроходимости (илеус) или симптоматический стеноз;
- если у Вашего ребенка боль в животе неясной этиологии.

Не давайте препарат ребенку, если у него имеется какое-либо из вышеперечисленных состояний. Если Вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, прежде чем дать ему препарат.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Форжект КИДС проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Сообщалось о случаях аллергических реакций, проявляющихся сыпью и отеком лица или горла (ангионевротический отек) у взрослых после приема препаратов, содержащих макрогол (полиэтиленгликоль). Сообщалось об отдельных случаях тяжелых аллергических проявлений, приведших к потере сознания, коллапсу или затруднению дыхания (анафилактический шок), а также к ощущению общего недомогания.

Если у Вашего ребенка проявляется какой-либо из упомянутых симптомов, немедленно обратитесь к лечащему врачу.

Лечение запоров с помощью лекарственных препаратов рекомендовано только как вспомогательное средство к здоровому образу жизни и диете, например:

- увеличение потребления жидкостей и клетчатки,
- адекватная физическая активность, которая способствует восстановлению моторики пищеварительного тракта.

Перед началом применения должны быть исключены органические расстройства желудочно-кишечного тракта.

Поскольку препарат иногда может вызывать диарею, прежде чем давать его ребенку, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки, если:

- у ребенка нарушена функция печени или почек;
- ребенок принимает диуретики (лекарства, усиливающие выведение мочи), потому что у Вашего ребенка может быть снижен уровень натрия и калия в крови.

В случае нарушения глотания перед приемом препарата Форжект КИДС проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентами с нарушением рвотного рефлекса, а также пациентами, склонными к срыгиванию или аспирации. Сообщалось о случаях аспирации, когда большой объем макрогола и электролитов вводился с помощью назогастрального зонда. Дети с неврологическими нарушениями, у которых есть нарушение глотания, подвержены риску аспирации.

Избегайте смешивания препарата Форжект КИДС с загустителями еды на основе крахмала, если испытываете затруднения при глотании. Это может привести к образованию жидкого раствора, который может попасть в легкие Вашего ребенка и вызвать респираторное заболевание, если Ваш ребенок не может правильно глотать.

Другие препараты и препарат Форжект КИДС

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Ваш ребенок принимает, недавно принимал или может начать принимать какие-либо другие препараты.

Всасывание других препаратов, особенно препаратов с узким терапевтическим индексом или коротким периодом полувыведения, таких как дигоксин, противоэпилептические средства, кумарины и иммунодепрессанты, может временно снижаться при одновременном применении с препаратом Форжект КИДС, что приводит к снижению их эффективности.

Рекомендуется принимать препарат Форжект КИДС спустя, по меньшей мере, 2 часа после применения других препаратов.

ЛП-№015066-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 05.05.2026 № 495
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002

Если Вы используете загустители для облегчения глотания жидкостей Вашим ребенком, препарат Форжект КИДС может нейтрализовать эффект загустителя и препятствовать его действию.

Препарат Форжект КИДС с пищей и напитками
Не применимо.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность.
Препарат Форжект КИДС можно принимать во время беременности и кормления грудью.
Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами
Исследования влияния препарата Форжект КИДС на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводились.

3. Прием препарата Форжект КИДС

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.
Рекомендуемая доза
Обычно рекомендуемая доза зависит от возраста Вашего ребенка.
- дети с 6 месяцев до 1 года: 1 пакет (4 г) в день.
- дети с 1 года до 4 лет: 1 – 2 пакета (4 – 8 г) в день.
- дети с 4 до 8 лет: 2 – 4 пакета (8 – 16 г) в день.

Путь и (или) способ введения
Препарат предназначен для приема внутрь.
Приготовление раствора препарата
Содержимое одного пакета следует растворить не менее, чем в 50 мл воды непосредственно перед тем, как дать его выпить ребенку.
Если достаточно 1 пакета, дайте его ребенку утром. Если требуется более 1 пакета, давайте препарат ребенку утром и вечером.
У детей старше 1 года суточная доза должна быть подобрана в зависимости от эффекта.
Препарат Форжект КИДС обычно действует в течение 24–48 часов.

Продолжительность терапии
Продолжительность лечения препаратом Форжект КИДС у детей не должна превышать 3 месяца.
Если симптомы сохраняются или усугубляются, обратитесь к лечащему врачу.

Если Вы приняли препарата Форжект КИДС больше, чем следовало
Прием слишком большого количества препарата Форжект КИДС может вызвать диарею, боль в животе или рвоту. Диарея обычно проходит, когда лечение прекращается или уменьшается доза.
Если у Вашего ребенка сильная диарея или рвота, Вам следует как можно скорее обратиться к врачу, поскольку ему может потребоваться лечение для предотвращения потери солей (электролитов) из-за потери жидкости.

Если вы забыли принять препарат Форжект КИДС

ЛП-№015066-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 05.05.2026 № 495
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002

Дайте ребенку пропущенную дозу, как только вспомните, а следующую дозу — в обычное время. Если задержка приема дозы составила более половины дня, пропустите непринятую дозу и вернитесь к обычному графику приема препарата.
Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызвать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.
Сразу прекратите прием препарата Форжект КИДС и немедленно обратитесь за медицинской помощью при возникновении перечисленных ниже симптомов серьезных нежелательных реакций у детей, которые наблюдались с неизвестной частотой (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):
- отек кожи лица, губ, века, горла, языка, затруднение дыхания (свистящий звук при вдохе или выдохе, удушье) и глотания, покраснение кожи, зуд кожи, крапивница, что может быть признаками реакции гиперчувствительности: анафилактического шока, отека Квинке;

Другие возможные нежелательные реакции, которые наблюдали при приеме препарата Форжект КИДС:
Часто – могут возникать не более чем у 1 человека из 10:
- Боль в животе;
- Диарея (может вызвать раздражение в области заднего прохода).

Нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100:
- Рвота;
- Вздутие живота;
- Тошнота.

Сообщение о нежелательных реакциях
Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже).
Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а
Телефон: +375 (17) 242-00-29
Факс: +375 (17) 242-00-29
Электронная почта: rcpl@rceth.by
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.rceth.by

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 (800) 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru

ЛП-№015066-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 05.05.2026 № 495
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002

Республика Армения
ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»
Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5
Телефоны: +374 (10) 20-05-05, +374 (96) 22-05-05
Электронная почта: info@ampra.am
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.pharm.am

Республика Казахстан
РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Адрес: 010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова, 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)
Телефон: +7 (7172) 235-135
Электронная почта: farm@dari.kz
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.ndda.kz

Кыргызская Республика
Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики
Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, д. 25
Телефон: +996 (312) 21-92-78, 0800-800-26-26
Электронная почта: pharm@dlsmi.kg
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.dlsmi.kg

5. Хранение препарата Форжект КИДС

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.
Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на пакете и картонной пачке после слов «Годен до:»
Датой истечения срока годности является последний день месяца.
Не применяйте препарат, если Вы заметили повреждение пакета.
Хранить в оригинальной упаковке (пакет) для защиты от влаги при температуре не выше 25ºС.
Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Форжект КИДС содержит
Действующим веществом является макрогол.
Каждый пакет содержит 4 г макрогола 4000 (полиэтиленгликоль).
Прочим ингредиентом (вспомогательным веществом) является: сукралоза (Е955).

Внешний вид препарата Форжект КИДС и содержимое упаковки
Порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей.
Содержимое пакета – белый или почти белый порошок.
По 4 г порошка в пакет из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги. По 10 пакетов вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель
Республика Беларусь
Республиканское производственное унитарное предприятие «АКАДЕМФАРМ»

ЛП-№015066-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 05.05.2026 № 495
последовательность 0002

Адрес: Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 5, корп. 3.
Адрес места производства: Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 5, корп. 3, пом. 1-9, 11-13, 16, 17, корп. 4.
тел./факс +375-17-268-63-64

За любой информацией о препарате, а также в случае возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь
Республиканское производственное унитарное предприятие «АКАДЕМФАРМ»
Адрес: Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 5, корп. 3.
тел./факс +375-17-268-63-64; +375-44-523-05-39.
Электронная почта: info@academpharm.by, TKrasnenkova@academpharm.by

Прочие источники информации
Подробные сведения о лекарственном препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств.